

**UREA BREATH TEST**  
**per l'individuazione della presenza di Helicobacter pylori nella mucosa gastrica.**

**ESECUZIONE DELLA PROVA FUNZIONALE**

Il paziente non deve assumere nelle **tre settimane precedenti** alcun antibiotico e alcun farmaco gastroprotettore (vedi lista allegata).

La mattina del test deve essere digiuno, non deve lavarsi i denti e nel caso dell' adulto non deve fumare e fare sforzi eccessivi.

**ISTRUZIONI PER PAZIENTI**

**NORME DI COMPORTAMENTO**

**Prima del test:**

**ANTIBIOTICI:** L'ASSUNZIONE DEVE ESSERE SOSPESA NELLE TRE SETTIMANE PRECEDENTI.  
**FARMACI GASTROPROTETTORI.** LA CUI ASSUNZIONE DEVE ESSERE INTERROTTA TRE SETTIMANE PRIMA DEL TEST.:( è possibile assumere solo farmaci da banco antiacidi ma assolutamente privi di pantoprazolo e simili).  
ANTEPSIN ( Sucralfato) PANTOPAN (Pantoprazolo) ANTRA (Omeprazolo) PANTORC (Pantoprazolo) AXAGON ( Esomeprazolo)  
PARIET (Rabeprazolo) BIOMAG (Cimetidina) PEPTAZOL (Pantoprazolo) BRUMETIDINA (Cimetidina)  
PEPTIREX ( Lansoprazolo )  
BUSCOPAN ANTIACIDO (Ranitidina) PERGASTRID ( Lansoprazolo ) CRAFTILM ( Sucralfato) RANIBEN (Ranitidina)  
CRONIZAT (Nizatidina) RANIBLOC (Ranitidina) ERMES ( Lansoprazolo ) RANIDIL (Ranitidina) ESOPRAL (Esomeprazolo ) ROXIT (Roxatidina) ETIDEME ( Cimetidina ) SENSIGARD ( Ranitidina) EUGASTRAN ( Lansoprazolo ) SUCRALFIN ( Sucralfato)  
FAMODIL (Famotidina) SUCRAMAL ( Sucralfato) FRILANS ( Lansoprazolo ) SUCRATE ( Sucralfato)  
GASTRALGIN (Roxatidina)  
SUCRORIL ( Sucralfato) GASTROGEL ( Sucralfato) SURIL ( Sucralfato) LANSOX (Lansoprazolo) TAGAMET (Cimetidina)  
LEVOGENIX ( Lansoprazolo ) TEMIC (Cimetidina) LIMPIDEX (Lansoprazolo) ULCEDIN (Cimetidina) LOMEVEL ( Lansoprazolo )  
ULCEX (Ranitidina) LOSEC (Omeprazolo) ULCRAST ( Sucralfato) LUCEN (Esomeprazolo ) ULIS (Cimetidina) MEPRAL (Omeprazolo)  
ZANTAC (Ranitidina) MOTIAX ( Famotidina ) ZOTON (Lansoprazolo) NEOH 2 (Roxatidina) NEXIUM (Esomeprazolo ) NIZAX (Nizatidina) OMEPRAZEN (Omeprazolo) PANTECTA (Pantoprazolo) PANTOLOC (Pantoprazolo)

**Durante il test:**

Il paziente resta in attesa, seduto, senza fumare, né bere, né mangiare per 10 minuti;

Tempi di risposta : circa una settimana.